Grundlagen der Mathematischen Statistik

Lineare Regression

Uwe Menzel, 2018

uwe.menzel@matstat.org

www.matstat.org

Lineare Regression

x_i : unabhängige Variablen (Prediktoren, Kovariate)

- **bekannt**, keine Zufallsvariablen!

y_i : abhängige Variablen (Zielvariablen, Responsvariablen)

- behaftet mit **Rauschen** (Messung), **Zufallsvariablen**

www.matstat.org

Lineare Regression

Wir nehmen an, dass es einen **linearen Zusammenhang zwischen x und y** gibt:

$$y = \alpha + \beta \cdot x$$

- α und β sind unbekannt, wir suchen Schätzungen für beide Parameter
- die Schätzungen werden auf der Basis einer Stichprobe gemacht
- Stichprobe = Messung von Zahlenpaaren (x_i, y_i)

www.matstat.org

Modell für den Rauschterm ε

Modell für den Rauschterm ε :

$$y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + \varepsilon_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad n = \text{Anzahl Messungen (Stichprobengröße)}$$

$\varepsilon_i = \text{"Rauschen"}$

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma)$$

$$E(\varepsilon_i) = 0$$

$$V(\varepsilon_i) = \sigma^2$$

Modell den Rauschterm

Annahmen:

- ε_i normalverteilt
- ε_i unabhängig
- ε_i haben alle die gleiche Varianz ("homoscedasticity")

www.matstat.org

Berechnung der Regressionslinie

Methode der kleinsten Quadrate:
(least squares method):

$$Q = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 \Rightarrow \text{Min} \quad \text{Idee}$$

Q : **Quadratsumme**
("sum of squares")

- Regressionslinie (- - - -) soll so gelegt werden, dass Q minimiert wird
- es wird das Quadrat der ε_i benutzt um auszuschließen, dass sich positive und negative Terme aufheben

Berechnung von α und β zur Minimierung von Q :

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta \cdot x_i)^2 \Rightarrow \text{Min}$$

Uwe Menzel, 2017

Berechnung der Regressionslinie

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta \cdot x_i)^2 \Rightarrow \text{Min}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial \alpha} &= -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i) = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial \beta} &= -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \alpha - \beta x_i) = 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial \alpha} \\ \frac{\partial Q}{\partial \beta} \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{setze partielle} \\ \text{Ableitungen Null} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n y_i - n \cdot \alpha - \beta \sum_{i=1}^n x_i &= 0 \\ \sum_{i=1}^n y_i \cdot x_i - \alpha \cdot \sum_{i=1}^n x_i - \beta \sum_{i=1}^n x_i^2 &= 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \sum_{i=1}^n y_i - n \cdot \alpha - \beta \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \cdot x_i - \alpha \cdot \sum_{i=1}^n x_i - \beta \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{lineare Gleichungen für } \alpha \text{ und } \beta \\ \text{(alle anderen Größen sind aus der} \\ \text{Stichprobe bekannt)} \\ \text{2 Gleichungen, 2 Variablen } \checkmark \end{array}$$

Uwe Menzel, 2017

Berechnung der Regressionslinie

Lösungen:

$$\beta^* = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$\alpha^* = \bar{y} - \beta^* \bar{x}$$

Schätzungen für α und β

(mit Gleichung 1)

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

Achtung! α^* und β^* sind Zufallsvariablen (beruhen auf einer Stichprobe):
neue Stichprobe ändert $\varepsilon_i \rightarrow y_i \rightarrow S_{xy} \rightarrow \alpha^*$

Für jedes x_0 erhält man jetzt eine **Schätzung der Responsvariablen** (x_0
muss nicht mit irgend einem der gemessenen x_i übereinstimmen):

$$\mu_0^* = \alpha^* + \beta^* \cdot x_0$$

www.matstat.org

Schätzung der Varianz des Rauschterms

Wir wollten Q minimieren. Wie groß wurde es?: $Q(\alpha, \beta) = \sum_i (y_i - \alpha - \beta \cdot x_i)^2$

Einsetzen der Werte welche Q minimieren, also α^* und β^* , ergibt:

$$\begin{aligned} Q_0 &= \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha^* - \beta^* x_i)^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - \bar{y} + \underbrace{\beta^* \cdot \bar{x} - \beta^* x_i}_{-\alpha^*}]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(y_i - \bar{y}) - \beta^* (x_i - \bar{x})]^2 = \dots = S_{yy} - S_{xy}^2 / S_{xx} \quad (\text{vollständig bekannt aus der Stichprobe}) \end{aligned}$$

Man kann die **Maximum-Likelihood-Methode** anwenden, um eine Schätzung für σ^2 zu finden. Diese liefert Q_0/n . Diese Schätzung muss jedoch korrigiert werden, um erwartungstreu zu werden:

$$s_r^2 = \frac{Q_0}{n-2} \quad E(s_r^2) = \sigma^2 \quad s_r^2 \text{ ist eine erwartungstreu Schätzung für } \sigma^2 \text{ (und } s_r \text{ eine erwartungstreu Schätzung für } \sigma)$$

$$(\sigma^2)^* = s_r^2 \quad \sigma^* = s_r \quad \text{Schätzung für Varianz/Standardabw. des Rauschterms } \varepsilon$$

Diese Formel ist anschaulich: je größer $Q = \sum_i \varepsilon_i^2$, desto größer σ (siehe Bild oben).

www.matstat.org

Berechnung der Regressionslinie

Beispiel: Bilirubingehalt (x) und Proteinkonzentration (y) in der Rückenmarksflüssigkeit von Neugeborenen

x	0.14	0.08	0.07	0.26	0.08	0.02	0.03	0.22	0.06	0.23
y	83	65	71	140	135	30	30	128	80	168
x	0.29	0.04	0.13	0.14	0.07	0.05	0.13	0.06	0.05	0.08
y	139	88	121	125	56	98	101	96	73	116

$$\bar{x} = 0.1115 \quad \sum x_i^2 = 0.3701$$

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 0.3701 - 20 \cdot 0.1115^2 = \underline{0.1215}$$

$$\bar{y} = 97.15 \quad \sum y_i^2 = 215061$$

$$S_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 215061 - 20 \cdot 97.15^2 = \underline{26299}$$

$$\sum x_i y_i = 259.79$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 259.79 - 20 \cdot 0.1115 \cdot 97.15 = \underline{43.1455}$$

www.matstat.org

Beispiel, Fortsetzung

Beispiel: Bilirubingehalt (x) und Proteinkonzentration (y) in der Rückenmarksflüssigkeit von Neugeborenen

$$\beta^* = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{43.1455}{0.1215} = \underline{\underline{355.2}} \text{ Anstieg}$$

$$\alpha^* = \bar{y} - \beta^* \cdot \bar{x} = 97.15 - 355.2 \cdot 0.1115 = \underline{\underline{57.5}}$$

Schätzung für die Responsvariable μ :

auch für x , die nicht gemessen wurden

$$\mu^* = \alpha^* + \beta^* \cdot x = 57.5 + 355.2 \cdot x$$

Für jedes x kann nun die erwartete Konzentration berechnet werden.

www.matstat.org

Berechnung der Regressionslinie

- x_0 kann auch zwischen den ursprünglich gemessenen x_i -Werten liegen
- α^* und β^* sind Zufallsvariablen → μ_0 ist eine Zufallsvariable (verändert sich wenn eine neue Stichprobe genommen wird).

www.matstat.org

Verteilung der Schätzer

Wir haben gesehen dass $\alpha^*, \beta^*, \mu_0^*, \dots$ Zufallsvariablen sind.
Welche Verteilung haben sie ?

$$y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + \varepsilon_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$y_i \sim N$ $\leftarrow$ $\varepsilon_i \sim N$

Die Responsvariable y_i ist normalverteilt, weil der Rauschterm ε_i normalverteilt ist.

Man kann ausrechnen (etwas umständlich, siehe Anhang):

$$\beta^* = \sum_{i=1}^n c_i \cdot y_i \quad \text{mit} \quad c_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}}$$

$$\alpha^* = \sum_{i=1}^n d_i \cdot y_i \quad \text{mit} \quad d_i = \frac{1}{n} - c_i \bar{x}$$

α^* und β^* sind Linearkombinationen von normalverteilten Zufallsvariablen (y_i)

$\Rightarrow \alpha^*, \beta^*, \mu_0^* \sim N$

$\Rightarrow$ die Regressionsvariablen $\alpha^*, \beta^*, \mu_0^*$ sind normalverteilt (wenn der Rauschterm normalverteilt ist).

www.matstat.org

Verteilung der Schätzer

Die Regressionsvariablen $\alpha^*, \beta^*, \mu_0^*$ sind normalverteilt. Wir können deren Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung berechnen:

$$E(\beta^*) = \dots = \underline{\underline{\beta}} \quad \text{erwartungstreue Schätzung (siehe Anhang für Herleitung)}$$

$$V(\beta^*) = \dots = \underline{\underline{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}}} \quad \text{konsistent, denn } S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \rightarrow \infty \text{ wenn } n \rightarrow \infty$$

$$E(\mu_0^*) = E(\alpha^* + \beta^* \cdot x_0) = E\left(\sum_{i=1}^n (d_i + c_i \cdot x_0) \cdot Y_i\right) = \dots = \alpha + \beta x_0 = \underline{\underline{\mu_0}}$$

$$V(\mu_0^*) = V(\alpha^* + \beta^* \cdot x_0) = V\left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} + c_i \cdot (x_0 - \bar{x})\right) \cdot Y_i\right) \quad \text{mit } d_i = \frac{1}{n} - c_i \cdot \bar{x}$$

$$= \dots = \underline{\underline{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right)}} \quad \text{(die Varianz ist groß wenn } x_0 \text{ weit weg von } \bar{x} \text{ liegt)}$$

Erwartungswert und Varianz für α^* folgen aus der Formel für μ_0^* mit $x_0 = 0$.

Uwe Menzel, 2017

Verteilung der Schätzer

Wir wissen nun, dass $\alpha^*, \beta^*, \mu_0^*$ normalverteilt sind, und wir kennen deren Erwartungswerte und Standardabweichungen. Das bedeutet, dass deren Verteilung vollständig bekannt ist:

$$\beta^* \sim N\left(\beta, \frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}\right)$$

Verteilung für Schätzung des Anstiegs (wenn $\varepsilon_i \sim N$)

$$\alpha^* \sim N\left(\alpha, \sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x})^2}{S_{xx}}}\right)$$

Verteilung für Schätzung des Interzeptes (wenn $\varepsilon_i \sim N$)

$$\mu_0^* \sim N\left(\mu_0, \sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}\right)$$

Verteilung für Schätzung der Responsvariablen (wenn $\varepsilon_i \sim N$)
für $x_0 = 0$ wird dies die Verteilung für α

Alle Schätzer sind erwartungstreu und konsistent.

www.matstat.org

Konfidenzintervall für β

Wir wollen ein Intervall ausrechnen, welches den wahren Wert von β mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (oft 95%) einschließt = **Konfidenzintervall**.

Wir nutzen die Verteilung für β^* aus, die wir oben berechnet haben:

$$\beta^* \sim N\left(\beta, \frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}\right)$$

Verteilung für die Schätzung des Anstiegs der Regressionsgeraden

$$\frac{\beta^* - \beta}{\sigma/\sqrt{S_{xx}}} \sim N(0, 1)$$

Wäre σ bekannt, so wäre dies eine Referenzvariable.

Wenn σ nicht bekannt ist, wird σ mit seiner Schätzung s_r ersetzt. Wie wir schon zuvor gesehen haben (z. B. Vorlesung Intervallschätzung, **F9**) verändert sich damit die Verteilung des Ausdrucks :

$$\sigma \rightarrow s_r$$

$$\frac{\beta^* - \beta}{s_r/\sqrt{S_{xx}}} \sim t(n-2)$$

Wenn σ unbekannt ist, ist dies eine Referenzvariable (die t-verteilt mit $f = n - 2$ Freiheitsgraden ist).

www.matstat.org

Konfidenzintervall für β

$$\frac{\beta^* - \beta}{s_r / \sqrt{S_{xx}}} \sim t(n-2) \quad \text{Referenzvariable} \quad \sigma \rightarrow s_r$$

1. Finde eine Referenzvariable
2. Schließe die Referenzvariable zwischen deren Quantilgrenzen ein
3. Schließe den zu schätzenden Parameter durch Umformen in der Klammer $P(\dots)$ zwischen bekannten Größen ein

$$I_\beta = \beta^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}$$

↑
↑
↑

Punktschätzer Quantil Standardfehler

$(1 - \alpha) \cdot 100\%$ **Konfidenzintervall** für den Anstieg der Regressionslinie (wenn σ unbekannt ist)

Analog kann ein Konfidenzintervall für das Interzept α hergeleitet werden:

$$I_\alpha = \alpha^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot s_r \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}$$

$(1 - \alpha) \cdot 100\%$ KI für das Interzept (σ unbekannt)

Meist ist der Anstieg wichtiger: wenn der Anstieg verschieden von Null ist (d.h. wenn das KI nicht die Null enthält), dann existiert ein Zusammenhang zwischen x und y .

www.matstat.org

Beispiel, KI für β

Beispiel: Bilirubingehalt (x) und Proteinkonzentration (y)

$$S_{xx} = 0.1215 \quad S_{yy} = 26299 \quad S_{xy} = 43.1455 \quad \beta^* = 355.2$$

Gesucht: 95% Konfidenzintervall für den Anstieg der Regressionslinie

$$Q_0 = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 26299 - \frac{43.1455^2}{0.1215} = 10973$$

$$s = \sqrt{Q_0 / (n-2)} = \sqrt{10973 / (20-2)} = 24.7$$

$$d = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}} = \frac{24.7}{\sqrt{0.1215}} = 70.9$$

$$t_{\alpha/2}(n-2) = t_{0.025}(18) = 2.1$$

$$I_\beta = \beta_{obs}^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot d = 355.2 \pm 2.1 \cdot 70.9 = \underline{\underline{(210, 500)}}$$

www.matstat.org

Konfidenzintervall für μ_0

$$\frac{\mu_0^* - \mu_0}{d} \sim t(n-2) \quad \text{Referenzvariable} \quad \sigma \rightarrow s_r$$

$$\text{mit } d = s_r \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \quad \text{Standardfehler}$$

1. Finde eine Referenzvariable
2. Schließe die Referenzvariable zwischen deren Quantilgrenzen ein
3. Schließe den zu schätzenden Parameter durch Umformen in der Klammer $P(\dots)$ zwischen bekannten Größen ein

$$I_{\mu_0} = \mu_0^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot d \quad (1 - \alpha) \cdot 100\% \text{ Konfidenzintervall für die Responvariable (wenn } \sigma \text{ unbekannt)}$$

↑ Punktschätzer
 ↑ Quantil
 ↑ Standardfehler

www.matstat.org

Zusammenfassung: KI für Regression

a) σ bekannt

$$I_{\beta} = \beta^* \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}$$

$$I_{\mu_0} = \mu_0^* \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot \sigma \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

$$I_{\alpha} = \alpha^* \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot \sigma \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}$$

b) σ unbekannt

$$I_{\beta} = \beta^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}$$

$$I_{\mu_0} = \mu_0^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot s_r \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

$$I_{\alpha} = \alpha^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot s_r \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}$$

www.matstat.org

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

$$Q_0 = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$$

$$s_r = \sqrt{\frac{Q_0}{n-2}}$$

ergibt sich aus I_{μ_0} für $x_0 = 0$
 $\mu_0^* = \alpha^* + \beta^* \cdot x_0$

Uwe Menzel, 2017

Beispiel, KI für μ_0

Beispiel: Bilirubingehalt (x) und Proteinkonzentration (y)

$$\bar{x} = 0.1115 \quad S_{xx} = 0.1215 \quad \alpha^* = 57.5 \quad \beta^* = 355.2$$

$$s = 24.7$$

Gesucht: 95% Konfidenzintervall für μ_0 für $x_0 = 0.2$

$$\mu_0^* = \alpha^* + \beta^* \cdot x_0 = 57.5 + 355.2 \cdot 0.2 \approx 129$$

$$d = s \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = 24.7 \sqrt{\frac{1}{20} + \frac{(0.2 - 0.1115)^2}{0.1215}} = 8.38$$

$$I_{\mu_0} = \mu_{obs}^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot d = 129 \pm t_{0.025}(18) \cdot 8.38 = \underline{\underline{(110, 150)}}$$

www.matstat.org

Konfidenzintervall für μ_0

$$I_{\mu_0} = \mu_0^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot s_r \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \quad (1 - \alpha) \cdot 100\% \text{ KI für die Responvariable}$$

x_0 ist der Punkt auf der x -Achse für den wir ein KI für die Responvariable haben wollen. Die oben stehende Formel zeigt, dass das Konfidenzintervall desto breiter wird, je weiter der Punkt x_0 vom Mittelpunkt $\bar{x}$ aller x -Werte entfernt ist. Das Konfidenzintervall hat daher die folgende typische Form:

- weiter weg von $\bar{x}$ wird die Schätzung unsicherer (das KI wird breiter)
- eine Extrapolation weit weg von allen x_i ist daher sehr unsicher

Bildquelle:

<https://rpubs.com/aaronsc32/regression-confidence-prediction-intervals>

www.matstat.org

Bestimmtheitsmaß (R^2)

Wie gut "funktioniert" die Regressionslinie ?

$$R^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_{tot}} = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - y_i^*)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}} \quad \text{Bestimmtheitsmaß, Definition}$$

$$SS_{tot} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2 \quad \text{totale Quadratsumme ("Sum of Squares")}$$

$$SS_{reg} = \sum_i (y_i^* - \bar{y})^2 \quad \text{Quadratsumme für Regression}$$

$$SS_{res} = \sum_i (y_i - y_i^*)^2 \quad \text{Quadratsumme für Residuen}$$

$$SS_{tot} = SS_{reg} + SS_{res}$$

www.matstat.org

Bestimmtheitsmaß (R^2)

Wie gut "funktioniert" die Regressionslinie ?

$$R^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_{tot}} = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - y_i^*)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}}$$

schlechte Anpassung $\rightarrow 0 \leq R^2 \leq 1 \leftarrow$ gute Anpassung

$$R^2 = r_{xy}^2 \quad (\text{für einfache lineare Regression}) \quad r_{xy} = \frac{c_{xy}}{s_x \cdot s_y} \quad \begin{array}{l} \text{Korrelationskoeffizient} \\ c_{xy} = \text{Kovarianz} \end{array}$$

www.matstat.org

Nichtlinearer Zusammenhang zwischen x und y

- es kann trotzdem lineare Regression angewendet werden
- mit "linear" ist gemeint, dass die Koeffizienten α und β linear im Modell auftreten !

Beispiel 1: Quadratischer Zusammenhang

$$y_i = \alpha + \beta \cdot x_i^2 + \varepsilon_i \quad \text{quadratischer Term für } x$$

$$z_i = x_i^2 \quad x_i \text{ sind bekannt, } z_i = \text{"neue" Messwerte}$$

$$y_i = \alpha + \beta \cdot z_i + \varepsilon_i \quad \text{gewöhnliche lineare Regression} \rightarrow \alpha^*, \beta^* \text{ berechnen}$$

$$\Rightarrow \mu_0^* = \alpha^* + \beta^* \cdot z_0 = \alpha^* + \beta^* \cdot x_0^2 \quad \text{Parabel } \mu_0(x_0)$$

Beispiel 2: Exponentieller Zusammenhang

$$y_i = \alpha + \beta \cdot e^{-x_i^2} + \varepsilon_i$$

$$z_i = e^{-x_i^2}$$

!! In R können nicht-lineare Ausdrücke direkt formuliert werden: Funktion `lm()`

www.matstat.org

Validierung der durchgeführten Regression

- es muss kontrolliert werden, ob lineare Regression angewendet werden kann
- "rein technisch" funktioniert es (fast) immer, eine Regressionslinie auszurechnen (d. h. α^* und β^* auszurechnen)

Anscombe's 4 Regression data sets

- Alle vier Stichproben ergeben die gleiche Regressionslinie!
- Es ist daher wichtig, immer eine Grafik anzufertigen!
- Außerdem sollte der Wert von R^2 nicht zu klein sein.

www.matstat.org

Validierung der durchgeführten Regression

Unser Modell setzt voraus, dass $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma)$, d. h. dass alle ε_i die gleiche Varianz haben: $V(\varepsilon_i) = \sigma^2$. Außerdem soll der Erwartungswert der ε_i Null sein. Um dies (grob) zu überprüfen, kann man die ε_i über x plotten:

Die Werte ε_i des Rauschterms ("Residuen") sollten um Null verteilt liegen und sollten sich nicht systematisch mit x vergrößern oder verkleinern (es sollte sich z. B. kein trichterförmiges Bild ergeben).

```
residuals = resid(lm.out)
plot(residuals, x)
```

www.matstat.org

Validierung der durchgeführten Regression

Wir haben angenommen, dass $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma)$, d. h. dass der Rauschterm (ε_i) normalverteilt ist. Um zu überprüfen, ob dies stimmt, kann man einen sog. **QQ-plot** mit den Residuen zeichnen:

nicht gut!

Die Mehrzahl der Punkte sollte auf der roten Geraden liegen.

```
residuals = resid(lm.out)
qqnorm(residuals)
qqline(residuals)
```

www.matstat.org

Validierung der durchgeführten Regression

Wir haben angenommen, dass die Werte des Rauschterms ε_i unabhängig sind. Um zu kontrollieren, ob dies stimmt, kann man die Autokorrelation der ε_i zeichnen:

Die Mehrzahl der Werte der Autokorrelation (möglichst alle bis auf den Wert für "Lag = 0") sollte klein sein, d. h. innerhalb der Konfidenzgrenzen liegen (blaue Linie -----)

```
auto.cor = acf(resid(lm.out))
plot(auto.cor)
```

www.matstat.org

Anhang

Lineare Regression

Uwe Menzel, 2018

uwe.menzel@matstat.org

www.matstat.org

Der Schätzer β^* ist eine Linearkombination der y_i

$$\begin{aligned}
 \beta^* &= \frac{1}{S_{xx}} S_{xy} = \frac{1}{S_{xx}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\
 &= \frac{1}{S_{xx}} \sum_{i=1}^n (x_i y_i - \bar{x} y_i - x_i \bar{y} + \bar{x} \bar{y}) \\
 &= \frac{1}{S_{xx}} \left[\sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} y_i - n \bar{x} \bar{y} + n \bar{x} \bar{y} \right] \\
 &= \frac{1}{S_{xx}} \left[\sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} y_i \right] \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} \cdot y_i \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i \cdot y_i \quad \text{mit} \quad c_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} \quad (\text{die } c_i \text{ sind keine Zufallsvariablen})
 \end{aligned}$$

Uwe Menzel, 2017

Der Schätzer α^* ist eine Linearkombination der y_i

$$\begin{aligned}
 \alpha^* &= \bar{y} - \beta^* \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n c_i \cdot y_i \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - c_i \bar{x} \right) y_i \\
 &= \sum_{i=1}^n d_i \cdot y_i \quad \text{mit} \quad d_i = \frac{1}{n} - c_i \bar{x} \quad (\text{die } d_i \text{ sind keine Zufallsvariablen})
 \end{aligned}$$

www.matstat.org

Der Schätzer β^* ist erwartungstreu

$$\begin{aligned}
 E(\beta^*) &= E\left(\sum_{i=1}^n c_i y_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i E(y_i) = \sum_{i=1}^n c_i (\alpha + \beta x_i) \\
 &= \alpha \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} + \beta \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} x_i \quad \text{ty } c_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} \\
 &= \frac{\alpha}{S_{xx}} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) + \frac{\beta}{S_{xx}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) x_i \\
 &= \frac{\alpha}{S_{xx}} \cdot 0 + \frac{\beta}{S_{xx}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) (x_i - \bar{x}) \quad \text{ty } \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \bar{x} = 0 \\
 &= 0 + \frac{\beta}{S_{xx}} S_{xx} \\
 &= \beta \quad \text{erwartungstreu!}
 \end{aligned}$$

Uwe Menzel, 2017

Der Schätzer β^* ist konsistent

$$\begin{aligned}
 V(\beta^*) &= V\left(\sum_{i=1}^n c_i y_i\right) = \sum_{i=1}^n V(c_i y_i) \quad \text{wegen Unabhängigkeit!} \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i^2 V(y_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}}\right)^2 \sigma^2 \\
 &= \frac{\sigma^2}{S_{xx}^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\
 &= \frac{\sigma^2}{S_{xx}} \quad \text{denn } S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\
 S_{xx} &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \rightarrow \infty \text{ wenn } n \rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

Die Varianz für β^* ist klein wenn die x - Werte "ausgebreitet" sind
($\rightarrow$ großes S_{xx})!

www.matstat.org

Erwartungswert und Varianz für den Schätzer μ_0

$$\mu_0^* = \alpha^* + \beta^* \cdot x_0$$

$$\begin{aligned} E(\mu_0^*) &= E(\alpha^* + \beta^* \cdot x_0) = E\left(\sum_{i=1}^n (d_i + c_i x_0) Y_i\right) \\ &= \dots \\ &= \alpha + \beta x_0 = \mu_0 \quad \text{erwartungstreu!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(\mu_0^*) &= V(\alpha^* + \beta^* \cdot x_0) = V\left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} + c_i \cdot (x_0 - \bar{x})\right) \cdot Y_i\right] = \dots \\ &\dots = \sigma^2 \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right) \end{aligned}$$

www.matstat.org

Referenzvariabel für die Berechnung eines KI für β

$$\beta^* \sim N\left(\beta, \frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}\right) \Rightarrow Z = \frac{\beta^* - \beta}{\sigma/\sqrt{S_{xx}}} \sim N(0, 1)$$

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma) \quad V(\varepsilon_i) = \sigma^2 \quad V\left(\frac{\varepsilon_i}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} \cdot V(\varepsilon_i) = 1 \Rightarrow \frac{\varepsilon_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$Q_0 = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 \Rightarrow \frac{Q_0}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\varepsilon_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-2)$$

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi^2(n)}{n}}} \sim t(n) \quad \text{gilt allgemein für alle } n \Rightarrow \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi^2(n-2)}{n-2}}} \sim t(n-2)$$

$$\frac{Q_0}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2) \Rightarrow \frac{Z}{\sqrt{\frac{Q_0}{\sigma^2(n-2)}}} \sim t(n-2) \quad \text{setze nun obigen Ausdruck für } Z \text{ ein}$$

$$\frac{\frac{\beta^* - \beta}{\sigma/\sqrt{S_{xx}}}}{\sqrt{\frac{Q_0}{\sigma^2(n-2)}}} \sim t(n-2) \Rightarrow \boxed{\frac{\beta^* - \beta}{s_r/\sqrt{S_{xx}}} \sim t(n-2)} \quad \text{mit } s_r = \sqrt{Q_0/(n-2)}$$

Uwe Menzel, 2017

Konfidenzintervall für β

$$\frac{\beta^* - \beta}{s_r / \sqrt{S_{xx}}} \sim t(n-2) \quad \text{Referenzvariable}$$

$$P\left(-t_{\alpha/2}(n-2) < \frac{\beta^* - \beta}{\frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}} \leq +t_{\alpha/2}(n-2)\right) = 1 - \alpha$$

Einschließen zwischen Quantilen (siehe Abb.)
→ Umformen in der Klammer $P(\dots)$

$$P\left(\beta^* - t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}} < \beta \leq \beta^* + t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}\right) = 1 - \alpha$$

$$I_\beta = \beta^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}} \quad \text{Konfidenzintervall für } \beta$$

Uwe Menzel, 2017

Zusammenhang zwischen R^2 und Pearsons Korrelations-Koeffizient

$$R^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}} \quad \text{Bestimmtheitsmaß}$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}} \quad \text{Pearson-Korrelation}$$

Bestimmtheitsmaß R^2 und Pearsons Korrelations-Koeffizient sind für einfache lineare Regression (wenn wir nur eine unabhängige Variable haben) gleich.

www.matstat.org